



Sciroppo Pediatrico Antireflusso Sterile Senza Conservanti

Fabbricante:

 Bioitech S.r.l. - Via Chiana, 87 00198 Roma (Italy)

RefluBaby è un Dispositivo medico per il trattamento del reflusso gastroesofageo nei neonati e nei bambini senza l'utilizzo di sostanze ad azione farmacologica.

RefluBaby utilizza le proprietà dell'alginato per formare una barriera temporanea al livello del cardias (valvola di collegamento tra esofago e stomaco), che impedisce fisicamente la risalita del contenuto acido della digestione.

Il prodotto è sterile e privo di qualsiasi conservante e quindi può essere utilizzato nei neonati senza alcun rischio legato all'uso di queste sostanze.

INDICAZIONI PER L'USO

Trattamento del reflusso gastroesofageo nei neonati e nei bambini e dei sintomi correlati come concausa o secondari al reflusso gastroesofageo quali ad esempio: rigurgito, tosse, bruciore, infiammazione rinofaringea e disfonia.

Uso orale.

COMPOSIZIONE

Alginato crosslinkato, Sucralosio, Sodio bicarbonato, Aromi naturali, Acqua depurata

MODALITÀ D'USO

Evitare il contatto tra il cucchiaino dosatore ed il flacone durante il dosaggio.

Evitare che la parte interna del tappo o la superficie dell'apertura del flacone entrino in contatto con qualsiasi oggetto.

Una volta aperto il flacone deve essere utilizzato entro 7 giorni.

Lavare accuratamente il cucchiaino dopo ogni uso.

Neonati fino a 5 kg di peso: 2,5 ml, 5-10 minuti dopo la poppata o secondo diverso consiglio medico. In caso di rigurgito dopo la somministrazione è possibile somministrare altri 2,5 ml.

Bambini fino a 3 anni di età: 2,5-5 ml dopo i pasti ed al momento di coricarsi o secondo diverso consiglio medico.

Bambini fino a 12 anni: 5 ml dopo i pasti ed al momento di coricarsi o secondo diverso consiglio medico.

AVVERTENZE

- Non utilizzare se allergici o con nota ipersensibilità verso i componenti del prodotto.
- Non utilizzare in caso di ostruzione intestinale;
- Il prodotto è sterile fino alla prima apertura del flacone. Evitare di toccare con qualsiasi oggetto o superficie le superfici dell'apertura del flacone o l'interno del tappo durante l'uso. Richiudere bene il flacone con il tappo dopo l'uso;
- Evitare l'uso promiscuo;
- Eventuale prodotto eccedente residuo sul cucchiaino deve essere gettato e non rimesso nel flacone.
- In caso di reazioni avverse interrompere il trattamento e consultare il medico.
- In caso di assunzione di farmaci, assumere il prodotto almeno un'ora dopo la loro assunzione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare a tempera non superiore a 25 °C.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.

CONFEZIONE

3 flaconi da 40 ml con cucchiaino dosatore

Rev.1 del 18/02/2020

Dispositivo medico - Direttiva 93/42/CEE

CE 0477

